

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Infections : STIs)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10 ปี
ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2558
(ค.ศ. 2006 - 2015) อัตราป่วยมีแนวโน้ม
สูงขึ้นชัดเจนอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 1) ปี พ.ศ.
2558 (ค.ศ. 2015) สำนักโรคติดต่อวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รหัส 37 - 41,
79 - 81 รวม 39,926 ราย อัตราป่วย 61.02
ต่อประชากรแสนคน โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ประกอบด้วย โรคซิฟิลิส (37 -
Syphilis) 3,373 ราย ร้อยละ 8.44
หนองใน (38 - Gonorrhea) 8,554 ราย
(21.42) หนองในเทียม (39 - Non-Gonococcal
urethritis, NSU, NGU) 2,533
ราย (6.34) แผลริมอ่อน (40 - Chancroid,
Soft chancre) 814 ราย (2.03) ฝีมะม่วง
(41 - Lymphogranulomavenereum,
LGV) 244 ราย (0.61) ริมฝีปากอักเสบ (79
- Genital herpes simplex virus infec-
tion) 1,783 ราย (4.47) หูดอวัยวะเพศ
และทวารหนัก (80 - Condylomaacumi-
nata) 3,649 ราย (9.14) และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (81 - Vaginal
trichomoniasis, Pediculosis pubis and
others) 18,976 ราย (47.55) (รูปที่ 2) และ
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยพบเพศหญิง 25,315 ราย เพศชาย
14,611 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิง เท่ากับ 1 : 1.7 ผู้ป่วยสัญชาติไทย
ร้อยละ 92.28 รองลงมา คือ พม่า (1.86)
กัมพูชา (0.60) และลาว (0.45) กลุ่มอายุที่
พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตรา
ป่วยเท่ากับ 127.08 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี (87.78)
และ 35 - 44 ปี (73.22) (รูปที่ 3) ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ
34.18 รองลงมา คือ เกษตรกรรม (21.52)
นักเรียน (14.84) งานบ้าน (2.94) และ

ค้าขาย (2.53) ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 42.36 รองลงมา
คือ โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป (32.69) และสถานอนามัย (10.67)
พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 26,107 ราย ร้อยละ 65.39 ในเขตเทศบาล
13,819 ราย (34.61)

ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด 89.87 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง
(56.88) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (55.83) และภาคใต้ (46.02) อัตราป่วยย้อนหลัง 5 ปี
พบว่าภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุดทุกปี (รูปที่ 4) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 จังหวัด
คือ แม่ฮ่องสอน อัตราป่วย 236.42 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ศรีสะเกษ
(154.12) เชียงราย (153.84) เชียงใหม่ (147.07) ตรัง (130.35) จันทบุรี (129.82)
ฉะเชิงเทรา (118.31) พิษณุโลก (111.71) พะเยา (109.81) และปราจีนบุรี (105.67) (รูปที่ 5)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงมีอัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคในระดับต่ำ ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องให้เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย ในการป้องกันตนเองและคู่นอน
ทุกประเภท และสร้างเสริมความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ
โดยเฉพาะการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การศึกษา เรื่องเพศศึกษาให้เป็นมาตรการที่สำคัญ (School based HIV prevention
program) ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างถูกต้อง
เหมาะสม⁽¹⁾

เอกสารอ้างอิง

1. สุปิยา จันทรมณี เสาวพัทธ์ อ้นจ้อย บรรณาธิการ. ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์
กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มนักเรียน ประเทศไทย ปี พ.ศ.2558. (เอกสารอัดสำเนา)

ผู้เรียบเรียง

นิรมล ปัญสุวรรณ

บรรณาธิการวิชาการ

พญ.จรัสดาว บุญธิ




Fig.2

Reported cases of syphilis, gonorrhoea, NSU., chancroid, LGV by year, Thailand, 1981 - 2015




Fig.3

Reported cases of sexually transmitted infections (total) by age - group, Thailand, 2015




Fig.4

Reported cases of sexually transmitted infection (total) per 100,000 population by region, Thailand, 2011 - 2015




Fig.5

Reported cases of sexually transmitted infections (total) per 100,000 population by province, Thailand, 2015

