

การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย (Severe injury due to assaults)

ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สำนักกระบาดวิทยา ได้รับรายงานการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย จากโรงพยาบาล 33 แห่ง จำนวน 11,636 ราย ร้อยละ 7.17 ของการบาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุ และสูงเป็นลำดับ 4 ผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย เสียชีวิต 533 ราย ร้อยละ 6.74 โรงพยาบาลที่รับรักษามากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ รพ.ม.นครราชสีมา ร้อยละ 9.25 รองลงมา รพ.ศรพลสิทธิประสงค์ (6.47) รพ.ศ.อุดรธานี (6.21) รพ.ขอนแก่น (5.72) และรพ.สุรินทร์ (4.66)

ผู้บาดเจ็บรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 85.36 เพศหญิง ร้อยละ 14.64 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 5.8 กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี ถูกทำร้ายบาดเจ็บรุนแรงสูงสุด 2,356 ราย ร้อยละ 20.25 กลุ่มนี้เป็นเพศชาย 2,151 ราย ร้อยละ 91.30 ถูกทำร้ายโดยวัตถุมีคม (รหัส ICD-10 X99) สูงสุด 891 ราย ร้อยละ 37.82 รองลงมา ถูกทำร้ายโดยการยิงด้วยอาวุธปืนที่ไม่ระบุ (รหัส ICD-10 X95) 468 ราย (19.86) ถูกทำร้ายโดยการใช้อวัยวะ (ICD-10 Y04) 369 ราย (15.66) ถูกทำร้ายโดยการใช้อาวุธไม่มีคม (รหัส ICD-10 Y00) 325 ราย (13.79) ถูกทำร้ายโดยไม่ระบุวิธี (ICD-10 Y09) 179 ราย (7.60) มีการตีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 36.80 รองลงมา กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี 1,982 ราย (17.03) และกลุ่มอายุ 25 - 29 ปี 1,449 ราย (12.45)

เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ถูกทำร้าย 421 ราย ร้อยละ 3.62 เสียชีวิต 18 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 4.28 อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 3.7 อายุน้อยกว่า 1 ปี ถูกทำร้าย 13 ราย ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน (ICD-10 Y04) 1 ราย ร้อยละ 7.69 กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี ถูกทำร้าย 37 ราย ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน (ICD-10 Y04) 5 ราย (13.51) กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ถูกทำร้าย 49 ราย ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน (ICD-10 Y04) 14 ราย (28.51) กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ถูกทำร้าย 322 ราย ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน (ICD-10 Y04) 68 ราย (21.12) ช่วงเวลาที่กลุ่มเด็กอายุ น้อยกว่า 15 ปี ถูกทำร้ายสูงสุด ช่วงเวลา 18.00 - 23.59 น. 143 ราย ร้อยละ 33.97 รองลงมา เวลา 12.00 - 17.59 น. 142 ราย (33.73) และเวลา 0.00 - 05.59 น. 91 ราย (21.62) เกิดเหตุสูงสุดวันอาทิตย์ 77 ราย ร้อยละ 18.29 รองลงมา วันพุธ 66 ราย (15.68) เด็กถูกทำร้ายทุกเดือน สูงสุดเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม เดือนละ 41 ราย ร้อยละ 9.74 รองลงมา เดือนพฤศจิกายน 39 ราย (9.26) สถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ผู้บาดเจ็บรุนแรงมีภูมิลำเนาอยู่ร้อยละ 88.84 เกิดเหตุสูงสุด ที่บ้าน/บริเวณบ้าน 144 ราย ร้อยละ 34.20 ในจำนวนนี้มีเกิดเหตุที่บ้านผู้บาดเจ็บเอง สูงสุด 66 ราย ร้อยละ 45.14 รองลงมา เป็นบ้านญาติผู้ถูกทำร้าย 8 ราย (5.56) ถนนหรือทางหลวง 122 ราย (28.98) เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี มีการตีมีแอลกอฮอล์ 44 ราย ร้อยละ 10.45

อาชีพผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บรุนแรงสูงสุด 5,436 ราย ร้อยละ 46.72 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา 1,683 ราย (14.46) เกษตรกรรม 1,224 ราย (10.53) และไม่มีอาชีพ 1,214 ราย (10.44)

ผู้บาดเจ็บตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ 5,174 ราย ร้อยละ 44.47 ของผู้ที่ทราบประวัติการตีมี เพศชายมีการตีมีแอลกอฮอล์ 4,845 ราย (93.64) เพศหญิง 329 ราย (6.36) กลุ่มที่ตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์สูงสุด คือ กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี 975 ราย ร้อยละ 18.84 รองลงมา กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี 867 ราย (16.76) และกลุ่มอายุ 25 - 29 ปี 699 ราย (13.51)

ช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุด คือ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 23.59 น. 5,462 ราย ร้อยละ 46.94 รองลงมา เวลา 0.00 - 05.59 น. 3,155 ราย (27.11) และเวลา 12.00 - 17.59 น. 2,012 ราย (17.29) เกิดเหตุสูงสุดวันอาทิตย์ 1,989 ราย (17.09) วันเสาร์ 1,883 ราย (16.18) วันศุกร์ 1,638 ราย (14.08) การบาดเจ็บและเสียชีวิตกระจายทุกเดือน บาดเจ็บสูงสุดเดือนเมษายน 1,199 ราย ร้อยละ 10.30 รองลงมา มีนาคม 1,022 ราย (8.78) และมกราคม 1,011 ราย (8.69)

สถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ ร้อยละ 87.49 มีเพียง ร้อยละ 12.51 เกิดเหตุนอกพื้นที่ เกิดเหตุที่บ้าน 4,913 ราย ร้อยละ 42.22 รองลงมา ถนนหรือทางหลวง 2,666 ราย (22.91) สถานที่ค้าขายสินค้าและบริการ 1,459 ราย (12.54) การถูกทำร้ายในบ้านหรือบริเวณบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านผู้บาดเจ็บ 2,359 ราย (48.02) รองลงมา บ้านเพื่อนผู้บาดเจ็บ 221 ราย (4.50)

ในกลุ่มผู้ถูกทำร้ายบาดเจ็บรุนแรง ส่วนใหญ่ถูกทำร้ายด้วยวัตถุมีคม (ICD-10 X99) 4,025 ราย ร้อยละ 34.6 รองลงมา ถูกทำร้ายด้วยอาวุธไม่มีคม (ICD-10 Y00) 2,356 ราย (20.20) การถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน (ICD-10 Y04) 2,056 ราย (17.70) การถูกทำร้ายจากอาวุธปืน (ICD-10 X95) 1,565 ราย (13.40) และถูกทำร้ายโดยมีได้บอกรายละเอียด (ICD-10 Y09) 1,061 ราย (9.12)

การเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 533 ราย ร้อยละ 6.74 ซึ่งสูงเป็นลำดับ 4 ของการเสียชีวิตทุกสาเหตุ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ ร้อยละ 82.74 โรงพยาบาลที่รายงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รพ.ม.นครราชสีมา 53 ราย ร้อยละ 9.94 รองลงมา รพ.หาดใหญ่ 41 ราย (7.69) รพ.ขอนแก่น 40 ราย (7.50) รพ.นครราชสีมา

34 ราย (6.38) และรพศ.ตรัง 30 ราย (5.63) โดยแบ่งเป็น เสียชีวิต ในหอผู้ป่วย ร้อยละ 49.72 รองลงมา เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล (32.34) และเสียชีวิตห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (12.95) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 4.58 (รูปที่ 1)

ในกลุ่มผู้ถูกทำร้ายที่เสียชีวิต ส่วนใหญ่ถูกทำร้ายจาก อาวุธปืน (ICD-10 X95) 207 ราย ร้อยละ 38.80 รองลงมา วัตถุมีคม (ICD-10 X99) 129 ราย (24.20) วัตถุไม่มีคม (ICD-10 Y00) 72 ราย (13.50) ถูกทำร้ายโดยมิได้บอกรายละเอียด (ICD-10 Y09) 48 ราย (9.01) และโดยใช้กำลังกาย (ICD-10 Y04) 34 ราย (6.38)

แนวโน้มของปัญหา

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 วิเคราะห์จากโรงพยาบาล เครือข่าย 33 แห่ง การบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย สูงเป็นลำดับที่ 4 ของทุกปี การบาดเจ็บรุนแรง การเสียชีวิต แตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนอัตราป่วยตายของผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้าย มีแนวโน้มลดลง ปี พ.ศ. 2556 - 2558 การบาดเจ็บ การเสียชีวิต และอัตราป่วยตาย (รูปที่ 2) การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายพบในทุกกลุ่มอายุ เริ่มสูงตั้งแต่กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และสูงที่สุด กลุ่มอายุ 15 - 19 ปี หลังจากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 3) ผู้บาดเจ็บรุนแรงเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 85.35 เพศหญิงร้อยละ 14.65 อัตราส่วน เพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 5.8

การตีมีเครื่องมือแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บรุนแรง มีแนวโน้มลดลง ปี พ.ศ. 2555 - 2556 และเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2557 - 2558 และการเสียชีวิตสูงสุด ปี พ.ศ. 2558 (รูปที่ 4)

เวลาเกิดเหตุสูงสุด เวลา 18.00 - 23.29 น. ทั้ง 5 ปี รวม 31,088 ราย ร้อยละ 46.31 น. รองลงมา เวลา 0.00 - 05.59 น. รวม 18,141 ราย (27.02) (รูปที่ 5) วันที่เกิดเหตุสูงสุด วันอาทิตย์ 11,700 ราย ร้อยละ 17.43 รองลงมา วันเสาร์ 10,982 ราย (16.36) และวันศุกร์ 9,352 ราย (13.93) เดือนเกิดเหตุสูงสุด คือ เดือนเมษายน 6,833 ราย ร้อยละ 10.18 รองลงมา เดือนมีนาคม 6,089 ราย (9.07)

สถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงมีภูมิลำเนา ร้อยละ 87.38 และเกิดเหตุนอกพื้นที่ ร้อยละ 12.62 และผู้บาดเจ็บรุนแรงที่เสียชีวิต มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ร้อยละ 82.74 และเกิดเหตุนอกพื้นที่ ร้อยละ 17.26 บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด ในบ้านหรือบริเวณบ้าน จำนวนระหว่าง 4,913 - 6,099 ราย สูงสุดทุกปี (ปี พ.ศ. 2555 สูงที่สุด) รองลงมา เป็นถนนหรือทางหลวง 2,666 - 3,417 ราย สูงเป็นอันดับที่ 2 ทุกปี ร้านค้าและบริการ 1,459 - 2,002 ราย การถูกทำร้ายในบ้านหรือ บริเวณบ้านส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในบ้านผู้บาดเจ็บสูงสุดทุกปี จำนวน ระหว่าง 2,359 - 2,648 ราย รองลงมา บ้านเพื่อนผู้บาดเจ็บ และ บ้านญาติคู่กรณี

การมาโรงพยาบาลของผู้บาดเจ็บจากที่เกิดเหตุมีผู้นำส่ง รวม 5 ปี อันดับ 1 ญาติ เพื่อนหรือผู้เห็นเหตุการณ์ นำส่งสูงสุดทุกปี แต่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง อันดับ 2 ทุกปี ได้แก่ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี องค์การอื่นไม่ ขึ้นทะเบียน EMS และตำรวจ/ทหาร มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 6)

สรุป การบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต จากการถูกทำร้าย ปี พ.ศ. 2558 พบทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ตอนต้น เพศชายมากกว่าเพศหญิง อาชีพผู้ใช้แรงงาน นักเรียน/นักศึกษา และเกษตรกรกรรม เกิดเหตุในช่วงเวลาพลบค่ำ ในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ มีการตีมีเครื่องมือแอลกอฮอล์ ตั้งแต่อายุ 10 ปี สถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ผู้บาดเจ็บมีภูมิลำเนาอยู่ เกิดเหตุที่บ้าน ถูกทำร้ายด้วยวัตถุมีคม

ข้อเสนอแนะ

การควบคุมปัจจัยเสี่ยง อาวุธปืน และเครื่องมือแอลกอฮอล์ เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์การทำร้ายกัน และทำให้เกิด ความรุนแรง ดังนั้น จึงควรติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้เข้มงวด สำหรับ เครื่องตีมีเครื่องมือแอลกอฮอล์ ควรจัดระบบสังคมและควบคุมบริบท และสิ่งแวดล้อม ให้การตีมีเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะ และบุคคล เฉพาะที่ เวลา และกลุ่มบุคคล และห้ามไม่ให้ขายหรือ ให้เครื่องมือแอลกอฮอล์แก่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยเด็ดขาด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการ บาดเจ็บระดับชาติ จำนวน 33 แห่ง ที่เป็นฐานข้อมูลให้สำนักระบาดวิทยา ได้แก่ 1.รพ.เลิดสิน (กรุงเทพมหานคร) 2.รพ.นพรัตน์ราชธานี (กรุงเทพมหานคร) 3.รพ.พระนั่งเกล้า (นนทบุรี) 4.รพศ.พระนครศรีอยุธยา 5.รพศ.สระบุรี 6.รพศ.ชลบุรี 7.รพศ.ระยอง 8.รพศ.พระปกเกล้า (จันทบุรี) 9.รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ปราจีนบุรี) 10.รพม.นครราชสีมา 11.รพศ.บุรีรัมย์ 12.รพศ.สุรินทร์ 13.รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี) 14.รพศ.ขอนแก่น 15.รพศ.อุดรธานี 16.รพศ.ลำปาง 17.รพศ.อุดรดิตถ์ 18.รพศ. เชียงรายประชานุเคราะห์ (เชียงราย) 19.รพศ.สวรรคตประชารักษ์ (นครสวรรค์) 20.รพศ.พุทธชินราช (พิษณุโลก) 21.รพศ.ราชบุรี 22.รพศ. เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี) 23.รพศ.นครปฐม 24.รพม.นครศรีธรรมราช 25.รพศ.สุราษฎร์ธานี 26.รพศ.หาดใหญ่ (สงขลา) 27.รพศ.ตรัง 28.รพศ. ยะลา 29.รพ.พุทธโสธร (ฉะเชิงเทรา) 30.รพ.วชิระภูเก็ต (ภูเก็ต) 31.รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 32.รพ.กระบี่ 33.รพ.ตะกั่วป่า (พังงา)

ผู้เรียบเรียง

อนงค์ แสงจันทร์ทิพย์

บรรณาธิการวิชาการ

พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข

Fig.1 Percentage of death from drowning by status of death, Thailand, 2015




Fig.2 Proportion of severe injuries, death and CFR from assault, Thailand, 2011 - 2015




Fig.3 Proportion to severe injuries from assault, by age - group, Thailand, 2011 - 2015




Fig.4 Proportion of alcohol - related injuries from assault, Thailand, 2011 - 2015




Fig.5 Proportion of severe injuries from assault according by time, 2011 - 2015




Fig.6 Proportion of severe injuries form assault according by type of carrier personnels (transporting injured persons from the incident scene to hospital) Thailand, 2011 - 2015

